

使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

下痢、食あたりに ビオフェルミン®^{し しゃ やく}止瀉薬

生薬・乳酸菌配合

第2類医薬品

特徴

- * タンニン酸アルブミン、ゲンノショウコエキスがおなかにやさしく、下痢止めにはたります。
- * ロートエキスが腹痛を伴う下痢に効果的にはたります。
- * 乳酸菌が下痢のときにおこる腸内菌叢の乱れを整えます。
- * のみやすい、生薬特有の香味をもった、うすいかっ色～茶かっ色の細粒です。また、携帯に便利なスティックタイプの分包です。

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください
本剤または本剤の成分、牛乳によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください
胃腸鎮痛鎮痙薬、ロートエキスを含有する他の胃腸薬、乗物酔い薬
3. 服用後、乗物または機械類の運転操作をしないでください
(目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。)
4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
(母乳に移行して乳児の脈が速くなる場合があります。)



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 発熱を伴う下痢のある人、血便のある人または粘液便の続く人。
(3) 急性の激しい下痢または腹痛・腹部膨満・はきけ等の症状を伴う下痢のある人。
(本剤で無理に下痢をとめるとかえって病気を悪化させることがあります。)
(4) 妊婦または妊娠していると思われる人。
(5) 高齢者。
(6) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(7) 次の症状のある人。
排尿困難
(8) 次の診断を受けた人。
心臓病、緑内障
(9) 副交感神経遮断剤(ペラドンナ総アルカロイド、ヨウ化イソプロパミド、ロートエキス等)を含有する内服薬を服用している人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
精神神経系	頭痛
泌尿器	排尿困難
その他	顔のほてり、異常なまぶしさ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続または増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
口のかわき、目のかすみ
4. 5～6日間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

その他の注意

母乳が出にくくなる場合があります。

効能

下痢、腹痛を伴う下痢、消化不良による下痢、食あたり、水あたり、くだり腹、はき下し、軟便



用法・用量

次の量を、食後に水またはお湯で服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
15歳以上	1包	3回
11歳～14歳	$\frac{2}{3}$ 包	
8歳～10歳	$\frac{1}{2}$ 包	
5歳～7歳	$\frac{1}{3}$ 包	
5歳未満	服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 用法・用量を厳守してください。

成分

3包3.6g (15歳以上の1日服用量)中

成分	含量	はたらき
タンニン酸アルブミン(タンナルピン)	2,700mg	いたんだ腸粘膜を保護します。
ゲンノショウコエキス(生薬エキス)	600mg	民間薬として下痢止めに用いられ、いたんだ腸粘膜を保護します。
ロートエキス(生薬エキス)	33mg	腹痛を伴う下痢のときに異常にたかまった腸の動きを抑えます。
フェーカリス菌末(乳酸菌)	180mg	下痢、軟便のときに乱れた腸内菌叢のバランスを整えます。


添加物：バレイショデンブ

<成分に関連する注意>

生薬(薬用の草根木皮など)を用いた製品ですから、製品により細粒の色調や味が多少異なることがあります。効果には変わりありません。

保管および取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 1包を分けて服用した残りは、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



包装

6包(1.2g×6)、12包(1.2g×12)

本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

BioFermiln 製薬株式会社 お客様相談窓口

〒650-0021 神戸市中央区三宮町一丁目1番2号 電話 (078) 332-7210

受付時間：9:00～17:00 (土、日、祝日を除く)

製造販売元 BioFermiln 製薬株式会社 販売元 大正製薬株式会社

神戸市西区井吹台東町七丁目3番4

東京都豊島区高田3丁目24番1号