

服用に際しては、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品 芳香性健胃消化薬 **太田胃散**

⚠ 使用上の注意

- ⓧ してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります) 1. 透析療法を受けている人は服用しないでください 2. 長期連用しないでください
- 相談すること 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください (1) 医師の治療を受けている人。(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(3) 腎臓病、甲状腺機能障害の診断を受けた人。 2. 服用後、皮膚に発疹・発赤、かゆみの症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください 3. 2週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

■効能・効果 飲みすぎ、胸やけ、
胃部不快感、胃弱、胃もたれ、食べすぎ、胃痛、
消化不良、消化促進、食欲不振、胃酸過多、胃部・
腹部膨満感、はきけ(胃のむかつき、二日酔・悪酔のむか
つき、恶心)、嘔吐、胸つかえ、げっぷ、胃重 **■用法・用量**
成人(15歳以上)1回1.3g、8~14歳 1回0.65g、1日3回食後
又は食間に服用してください。(添付のさじはすり切り1杯で
約1.3gです。中ぶた裏のすり切り板をご使用ください。食間とは
食後2~3時間のことをいいます。) <用法・用量に関連する注意>
水又はぬるま湯で服用してください。小児に服用させる場合には、
保護者の指導監督のもとに服用させてください。**■成分**(1.3g中)
ケイヒ92mg、ウイキョウ24mg、ニクズク20mg、チョウジ12mg、
チンピ22mg、ゲンチアナ15mg、ニガキ末15mg、炭酸水素ナト
リウム625mg、沈降炭酸カルシウム133mg、炭酸マグネシウム
26mg、合成ケイ酸アルミニウム273.4mg、ビオヂアスターゼ40mg
〔添加物〕l-メントール **■保管及び取扱い上の注意** (1)直射
日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してくだ
さい。(2)小児の手の届かない所に保管してください。
<製品のお問い合わせ先>お客様相談室 ☎(03)3944-1311
受付時間9:30~17:00(土、日、祝日等を除く)
製造販売元 株式会社 太田胃散
東京都文京区千石2-3-2