

医薬品を正しく購入するための

説明文書

第一類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	リザレックコーワ
2	成分・分量	100mL 中 ミノキシジル 5g
3	用法・用量	成人男性（20歳以上）が、1日2回、1回1mLを脱毛している頭皮に塗布してください。
4	効能・効果	壮年性脱毛症における発毛、育毛及び脱毛（抜け毛）の進行予防。
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<p>1. 次の人は使用しないでください。</p> <ul style="list-style-type: none">(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(2) 女性。(3) 未成年者（20歳未満）。(4) 壮年性脱毛症以外の脱毛症（例えば、円形脱毛症、甲状腺疾患による脱毛等）の人、あるいは原因のわからない脱毛症の人。(5) 脱毛が急激であったり、髪が斑状に抜けている人。 <p>2. 次の部位には使用しないでください。</p> <ul style="list-style-type: none">(1) 本剤は頭皮にのみ使用し、内服しないでください。(2) きず、湿疹あるいは炎症（発赤）等がある頭皮。 <p>3. 本剤を使用する場合は、他の育毛剤及び外用剤（軟膏、液剤等）の頭皮への使用は、避けてください。又、これらを使用する場合は本剤の使用を中止してください。</p> <p>次に該当する人はお申し出ください</p> <ul style="list-style-type: none">(1) 今までに薬や化粧品等によりアレルギー症状（例えば、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等）を起こしたことがある人。(2) 高血圧の人、低血圧の人。(3) 心臓又は腎臓に障害のある人。(4) むくみのある人。(5) 家族、兄弟姉妹に壮年性脱毛症の人がいない人。(6) 高齢者（65歳以上）。(7) 次の診断を受けている人。 甲状腺機能障害（甲状腺機能低下症、甲状腺機能亢進症）。
6	薬剤師が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 法令により、要指導医薬品は必ず、第一類医薬品は薬剤師が必要と判断した場合を除いて、情報提供を行います。
3. 使用後、体調に変化等があった場合（副作用等）には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師にご相談下さい。

2019年3月作成