

医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

第一類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名 称	ヘルペシアクリーム
2	成分・分量	1g 中 アシクロビル 50mg
3	用法・用量	1日3～5回、適量を患部に塗布してください。 (唇やそのまわりにピリピリ、チクチクなどの違和感をおぼえたら、すぐに塗布してください)
4	効能・効果	口唇ヘルペスの再発 (過去に医師の診断・治療を受けた方に限る)
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	<p>1. 次の人は使用しないでください</p> <p>(1)初めて発症したと思われる人、患部が広範囲の人。(初めて発症した場合は症状がひどくなる可能性があり、患部が広範囲に及ぶ場合は重症ですので、医師の治療を受けてください)</p> <p>(2)本剤、本剤の成分又はバラシクロビル製剤によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(本剤の使用により再びアレルギー症状を起こす可能性があります)</p> <p>(3)6才未満の乳幼児。(乳幼児の場合、初めて感染した可能性が高いと考えられます)</p> <p>2. 次の部位には使用しないでください</p> <p>(1)目や目の周囲。(目に入って刺激を起こす可能性があります)</p> <p>(2)唇とそのまわりをのぞく部位。(口唇ヘルペスは唇及びその周囲にできるものです)</p> <p>3. 次に該当する人はお申し出ください</p> <ul style="list-style-type: none"> ・医師の治療を受けている人。(医師から処方されている薬に影響したり、本剤と同じ薬を使用している可能性もあります) ・妊婦又は妊娠していると思われる人。(薬の使用には慎重を期し、専門医に相談して指示を受ける必要があります) ・授乳中の人。(同じ成分の医療用の内服薬で、乳汁への移行が確認されています) ・薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(薬などでアレルギーを起こした人は、本剤でも起こる可能性があります) ・湿潤やただれがひどい人。(症状がひどい場合は専門医に相談して指示を受ける必要があります) ・アトピー性皮膚炎の人。(重症化する可能性がありますので専門医に相談して指示を受ける必要があります) <p>【小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。】</p>
6	薬剤師が必要 と判断する 事項	

【注意事項】

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 法令により、要指導医薬品は必ず、第一類医薬品は薬剤師が不要と判断した場合を除いて、情報提供を行います。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師にご相談下さい。