

医薬品を正しく購入するための
説 明 文 書

第一類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んでください

1	名 称	リアップX5チャージ
2	成分・分量	100mL 中 ミノキシジル 5.0g ピリドキシン塩酸塩 0.05g トコフェロール酢酸エステル 0.08g l-メントール 0.3g ジフェンヒドラミン塩酸塩 0.1g グリチルレチン酸 0.1g ヒノキチオール 0.05g パンテノール 1.0g
3	用法・用量	成人男性(20歳以上)が、1日2回、1回1mLを脱毛している頭皮に塗布してください。
4	効能・効果	壮年性脱毛症における発毛、育毛及び脱毛(抜け毛)の進行予防。
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<p>1. 次の人は使用しないでください。</p> <p>(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。</p> <p>(2)女性。 本剤は日本人女性における安全性が確認されていないため、女性の方はミノキシジルを1%配合したリジェンヌブランドの製品をご使用ください。</p> <p>(3)未成年者(20歳未満)。 国内での使用経験がありません。</p> <p>(4)壮年性脱毛症以外の脱毛症(例えば、円形脱毛症、甲状腺疾患による脱毛等)の人、あるいは原因のわからない脱毛症の人。 本剤は壮年性脱毛症でのみ有効です。</p> <p>(5)脱毛が急激であったり、髪が斑状に抜けている人。 壮年性脱毛症以外の脱毛症である可能性が高い。</p> <p>2. 次の部位には使用しないでください。</p> <p>(1)本剤は頭皮にのみ使用し、内服しないでください。 血圧が下がる等のおそれがあります。</p> <p>(2)きず、湿疹あるいは炎症(発赤)等がある頭皮。 きず等を悪化させることがあります。</p> <p>3. 本剤を使用する場合は、他の育毛剤及び外用剤(軟膏、液剤等)の頭皮への使用は、さけてください。また、これらを使用する場合は本剤の使用を中止してください。 これらの薬剤は本剤の吸収に影響を及ぼす可能性があります。</p> <p>4. 次に該当する人はお申し出ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 今までに薬や化粧品などによりアレルギー症状(例えば、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。 • 高血圧の人、低血圧の人。 本剤は血圧に影響を及ぼす可能性が考えられます。 • 心臓又は腎臓に障害のある人。 本剤は心臓や腎臓に影響を及ぼす可能性が考えられます。 • むくみのある人。 むくみを増強させる可能性が考えられます。 • 家族、兄弟姉妹に壮年性脱毛症の人がいない人。 壮年性脱毛症の発症には遺伝的要因が大きいと考えられます。 • 高齢者(65歳以上)。 一般に高齢者では好ましくない症状が発現しやすくなります。

		<ul style="list-style-type: none"> • 次の診断を受けている人。 甲状腺機能障害(甲状腺機能低下症、甲状腺機能亢進症)。 甲状腺疾患による脱毛の可能性があります。
6	薬剤師が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 法令により、要指導医薬品は必ず、第一類医薬品は薬剤師が必要と判断した場合を除いて、情報提供を行います。
3. 使用后、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師にご相談下さい。