

医薬品を正しく購入するための

説明文書

第一類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	エンペシドL
2	成分・分量	<1錠中>クロトリマゾール 100mg
3	用法・用量	次の量を膣深部に挿入してください。 <u>6日間</u> 毎日続けて使用してください。 <1回使用量>成人(15歳以上60歳未満) 1錠 15歳未満及び60歳以上は、使用しないでください。 <1日使用回数>1回(できれば就寝前) ただし、 <u>3日間</u> 使用しても症状の改善がみられないか、 <u>6日間</u> 使用しても症状が消失しない場合は医師の診療を受けてください。
4	効能・効果	膣カンジダの再発(過去に医師の診断・治療を受けた方に限る)
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<p>1. 次の人は使用しないでください</p> <p>(1)初めて発症したと思われる人。</p> <p>(2)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。</p> <p>(3)15歳未満又は60歳以上の人。</p> <p>(4)妊婦又は妊娠していると思われる人。</p> <p>(5)発熱、悪寒、下腹部痛、背中や肩の痛み、色のついた又は血に染まったおりもの、魚臭いおりもの、生理の停止、膣からの不規則又は異常な出血、膣又は外陰部における潰瘍、浮腫又はただれがある人。</p> <p>(6)次の診断を受けた人。糖尿病</p> <p>(7)本疾病を頻繁に繰り返している人。(1~2カ月に1回又は6カ月以内に2回以上)</p> <p>(8)膣カンジダの再発かわからない人。</p> <p>2. 次の部位には使用しないでください</p> <p>(1)膣内以外の部位。</p> <p>3. 本剤を使用中に次の医薬品を外陰部に使用しないでください</p> <p>(1)カンジダ治療薬以外の外皮用薬。</p> <p>次に該当する人はお申し出ください</p> <p>(1)医師の治療を受けている人。</p> <p>(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。</p> <p>(3)授乳中の人は。</p> <p>生理中は使用しないでください。使用中に生理になった場合は使用を中止してください。その場合は治癒等の確認が必要であることから、医師の診療を受けてください。</p>
6	薬剤師が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 法令により、要指導医薬品は必ず、第一類医薬品は薬剤師が不要と判断した場合を除いて、情報提供を行います。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師にご相談下さい。