

## 第1類医薬品

医薬品を正しく購入するための  
説明文書リザレック<sub>コーワ</sub>  
α5

使用前には必ず添付文書をお読み下さい。

1	名称	リザレックコーワα5										
2	成分・分量	100mL 中 ミノキシジル 5.0g / パントテニールエチルエーテル 1.0g / ピリドキシン塩酸塩 0.05g / トコフェロール酢酸エステル 0.08g / l-メントール 0.3g										
3	用法・用量	<p style="text-align: center;"><b>用法・用量</b></p> <p style="text-align: center;"><b>成人男性(20歳以上)が、 1日2回、1回1mLを 脱毛している頭皮に塗布してください。</b></p> <p>用法・用量を守り、効果がわかるようになるまで少なくとも4ヶ月間、毎日使用してください。効果を維持するには継続して使用することが必要で、使用を中止すると徐々に元に戻ります。又、毛髪が成長する程度には個人差があり、誰にでも効果があるわけではありません。以上の内容を十分ご理解の上、ご購入ください。</p> <p style="text-align: right;"><b>&lt;注意&gt;</b></p> <p>(1) 用法・用量の範囲より多量に使用しても、あるいは頻繁に使用しても効果はあがりません。定められた用法・用量を厳守してください。(決められた以上に多く使用しても、効果の増加はほとんどなく、副作用の発現する可能性が高くなります。)</p> <p>(2) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けてください。</p> <p>(3) 薬液のついた手で、目等の粘膜にふれると刺激があるので、手についた薬液はよく洗い落としてください。</p> <p>(4) アルコール等に溶けるおそれのあるもの(メガネわく、化学繊維等)にはつかないようにしてください。</p> <p>(5) 整髪料及びヘアセットスプレーは、本剤を使用した後に使用してください。</p> <p>(6) 染毛剤(ヘアカラー、毛染め、白髪染め等)を使用する場合には、完全に染毛を終えた後に本剤を使用してください。</p>										
4	効能・効果	<p style="text-align: center;"><b>効能・効果</b></p> <p style="text-align: center;"><b>壮年性脱毛症における 発毛、育毛及び脱毛(抜け毛)の進行予防。</b></p> <p style="text-align: center;"><b>&lt;この医薬品の対象となる壮年性脱毛症&gt;</b> リザレックコーワα5は、以下のようなパターンの脱毛あるいは薄毛に効果があります。</p> <p style="text-align: center;">注) 脱毛範囲がこれら以上の場合には効果が得られない可能性があります。</p>										
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<p style="text-align: center;"><b>⚠ 使用上の注意</b></p> <p><b>ⓧ してはいけないこと</b> (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こる可能性があります。)</p> <p><b>1. 次の人は使用しないでください。</b> (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (2) 女性。(日本人女性における安全性が確認されていません。) (3) 未成年者(20歳未満)。(国内での使用経験がありません。) (4) 壮年性脱毛症以外の脱毛症(例えば、円形脱毛症、甲状腺疾患による脱毛等)の人、あるいは原因のわからない脱毛症の人。(本剤は壮年性脱毛症でのみ有効です。) (5) 脱毛が急激であったり、髪が斑状に抜けている人。(壮年性脱毛症以外の脱毛症である可能性が高いです。)</p> <p><b>2. 次の部位には使用しないでください。</b> (1) 本剤は頭皮にのみ使用し、内服しないでください。(血圧が下がる等のおそれがあります。) (2) ぎず、湿疹あるいは炎症(発赤)等がある頭皮。(ぎず等を悪化させることがあります。)</p> <p><b>3. 本剤を使用する場合は、他の育毛剤及び外用剤(軟膏、液剤等)の頭皮への使用は、避けてください。又、これらを使用する場合は本剤の使用を中止してください。(これらの薬剤は本剤の吸収に影響を及ぼす可能性があります。)</b></p> <p><b>📖 相談すること</b></p> <p><b>1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。</b> (1) 今までに薬や化粧品等によりアレルギー症状(例えば、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。 (2) 高血圧の人、低血圧の人。(本剤は血圧に影響を及ぼす可能性が考えられます。) (3) 心臓又は腎臓に障害のある人。(本剤は心臓や腎臓に影響を及ぼす可能性が考えられます。) (4) むくみのある人。(むくみを増強させる可能性が考えられます。) (5) 家族、兄弟姉妹に壮年性脱毛症の人がいない人。(壮年性脱毛症の発症には遺伝的要因が大きいと考えられます。) (6) 高齢者(65歳以上)。(一般に高齢者では好ましくない症状が発現しやすくなります。) (7) 次の診断を受けている人。甲状腺機能障害(甲状腺機能低下症、甲状腺機能亢進症)。(甲状腺疾患による脱毛の可能性ががあります。)</p> <p><b>2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください。</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>関係部位</th> <th>症 状</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>皮膚</td> <td>頭皮の発疹・発赤*、かゆみ、かぶれ、ふけ、使用部位の熱感等</td> </tr> <tr> <td>精神神経系</td> <td>頭痛、気が遠くなる、めまい</td> </tr> <tr> <td>循環器</td> <td>胸の痛み、心拍が速くなる</td> </tr> <tr> <td>代謝系</td> <td>原因のわからない急激な体重増加、手足のむくみ</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">*頭皮以外にあらわれることもあります。</p> <p><b>3. 6ヶ月間使用して、次のいずれにおいても改善が認められない場合は、使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください。</b> 脱毛状態の程度、生毛・軟毛の発生、硬毛の発生、抜け毛の程度(太い毛だけでなく細く短い抜け毛の減少も改善の目安となります。)(壮年性脱毛症以外の脱毛症であったり、脱毛が他の原因によるものである可能性があります。)</p> <p><b>4. 使用開始後6ヶ月以内であっても、脱毛状態の悪化や、次のような脱毛が見られた場合は、使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください。</b> 頭髪以外の脱毛、斑状の脱毛、急激な脱毛等。(壮年性脱毛症以外の脱毛症であったり、脱毛が他の原因によるものである可能性があります。)</p> <p><b>その他の注意</b></p> <p>(1) 毛髪が成長するには時間がかかります。効果がわかるようになるまで少なくとも4ヶ月間、毎日使用してください。(ミノキシジルローション5%製剤の有効性は4ヶ月使用後から認められています。) (2) 毛髪が成長する程度には個人差があり、本剤は誰にでも効果があるわけではありません。 (3) 効果を維持するには継続して使用することが必要で、使用を中止すると徐々に元に戻ります。(本剤は壮年性脱毛症の原因を取り除くものではありません。)</p> <p style="text-align: center;"><b>📦 保管及び取扱い上の注意</b></p> <p>(1) 使用后、キャップをして、直射日光や高温、寒冷の場所を避け、涼しい所に保管してください。 (2) 小児の手の届かない所に保管してください。 (3) 誤用を避け、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。 (4) 火気に近づけないでください。 (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。</p>	関係部位	症 状	皮膚	頭皮の発疹・発赤*、かゆみ、かぶれ、ふけ、使用部位の熱感等	精神神経系	頭痛、気が遠くなる、めまい	循環器	胸の痛み、心拍が速くなる	代謝系	原因のわからない急激な体重増加、手足のむくみ
関係部位	症 状											
皮膚	頭皮の発疹・発赤*、かゆみ、かぶれ、ふけ、使用部位の熱感等											
精神神経系	頭痛、気が遠くなる、めまい											
循環器	胸の痛み、心拍が速くなる											
代謝系	原因のわからない急激な体重増加、手足のむくみ											

### リザレックローα5をご購入のお客様へ

本剤はミノキシジルを有効成分とする発毛剤です。正しくお使いいただくため、次のことをお守りください。

- ご購入の前に、右記のチェックシートで壮年性脱毛症のセルフチェックを行ってください。
- 次の場合は本剤を使用しないでください。
  - 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - 女性。
  - 未成年者（20歳未満）。
  - 壮年性脱毛症以外の脱毛症（例えば、円形脱毛症、甲状腺疾患による脱毛等）の人。
  - 原因のわからない脱毛症の人。
  - 脱毛が急激であったり、髪が斑状に抜けている人。
  - 頭皮にさす、湿疹あるいは炎症（発赤）等がある場合。
- 次の方は本剤ご購入前に必ず医師又は薬剤師に相談してください。
  - 高血圧・低血圧等で現在治療中の方。
  - 狭心症等、心臓に障害のある方。
  - 甲状腺機能障害（甲状腺機能低下症、甲状腺機能亢進症）の方。
- 商品をご購入する上でわからない点がありましたら必ず薬剤師に相談してください。

### リザレックローα5を使用しているときのご注意

- 次のような場合には、使用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。
  - 頭皮に発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、ひげ、使用部位の熱感等の症状があらわれた場合。  
\*頭皮以外にあらわれることもあります。
  - 頭痛が起きた場合。
  - 胸の痛みがでたり、心拍が速くなったり、気が遠くなったり、めまいが起きた場合。
  - 原因のわからない急激な体重増加がみられた場合。
  - 手足がむくんだ場合。
  - 脱毛状態の悪化や、頭頂部だけでなく側頭部や後頭部等の頭部全体の脱毛、頭髪以外の脱毛、斑状の脱毛、急激な脱毛等がみられた場合。
- ご使用に際しては、製品に同封している説明書やお客様用解説書をよくお読みになり、正しくお使いください。


**このお薬についてのお問い合わせ先**

このお薬についてのご相談又はお問い合わせは、  
お買い求めのお店又は下記へお願いします。

**興和株式会社 医薬事業部 お客様相談センター**  
〒103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14  
**TEL: 03-3279-7755** FAX: 03-3279-7566  
電話受付時間：月～金（祝日を除く）9:00～17:00

### リザレックローα5 セルフチェックシート

次の項目にあてはまる方は、にチェックを記入後、薬剤師にお渡しください。

本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある。	Yes	<input type="checkbox"/> ①使用しないでください。
↓ No	Yes	<input type="checkbox"/> ②使用しないでください。本剤は男性用です。
女性である。	↓ No	
↓ No	Yes	<input type="checkbox"/> ③使用しないでください。 (国内での使用経験がありません。)
20歳未満である。	↓ No	
頭髪が簡単に抜けてしまったり、脱毛の部分が円形や楕円形で、脱毛部分にうぶ毛がない。	Yes	<input type="checkbox"/> ④使用しないでください。 (壮年性脱毛症以外の要因による脱毛症の可能性ががあります。)
↓ No	Yes	<input type="checkbox"/> ⑤さす、湿疹あるいは炎症（発赤）を治してから再確認してください。 (さす等を悪化させることがあります。)
急激に脱毛している。	↓ No	
↓ No	Yes	<input type="checkbox"/> ⑥使用しないか、使用する前に、医師又は薬剤師に相談してください。 (壮年性脱毛症以外の要因による脱毛症の可能性ががあります。)
頭皮にさす、湿疹あるいは炎症（発赤）がある。	↓ No	
↓ No	Yes	<input type="checkbox"/> ⑦使用を控えることをおすすめします。 使用する場合は、必ず医師又は薬剤師に相談してください。 (本剤は血圧に影響を及ぼす可能性が考えられます。)
以下のようなパターンの脱毛あるいは薄毛ではない。 	↓ No	
家族や兄弟姉妹に壮年性脱毛症の人はいない。	↓ No	
↓ No	Yes	<input type="checkbox"/> ⑧使用する前に、医師又は薬剤師に相談してください。 (甲状腺疾患による脱毛の可能性ががあります。)
高血圧・低血圧で現在治療を受けている。 狭心症等、心臓に障害がある。	↓ No	
↓ No	Yes	<input type="checkbox"/> ⑨使用する前に、医師又は薬剤師に相談してください。 (副作用の発現率が高くなる可能性があります。)
甲状腺機能障害（甲状腺機能低下症、甲状腺機能亢進症）の診断を受けている。	↓ No	
↓ No	Yes	<input type="checkbox"/> ⑩一般に高齢者では好ましくない症状が発現しやすくなるため、使用する前に、医師又は薬剤師に相談してください。 (副作用の発現率が高くなる可能性があります。)
薬や化粧品等によりアレルギー症状（例えば、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等）を起こしたことがある。 高血圧又は低血圧である。 心臓や腎臓に障害がある。 むくみがある。	↓ No	
↓ No	Yes	<input type="checkbox"/> リザレックローα5を使用できます。 使用上の注意や製品パッケージに記載された事項をよくお読みになり、ご購入ください。
65歳以上である。	↓ No	
上記のいずれにも該当しない。 又は該当した⑥～⑩について相談済みである。	Yes	

薬剤師が  
必要と  
判断する事項

【注意事項】

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に役立たせるために必要な情報です。
2. 法令により、要指導医薬品は必ず、第1類医薬品は薬剤師が不要と判断した場合を除いて、情報提供を行います。
3. 服用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には服用を中止し、すぐに購入された店舗または薬剤師にご相談下さい。